

Mod. Preparazione esami TAC e RM con mezzo di contrasto

Per i pazienti **ALLERGICI** seguire il seguente schema:

Pazienti allergici a:

- o Alimenti
- Farmaci
- Pelo cane/gatto
- o Orticaria
- Pazienti asmatici
- Rinite
- Congiuntivite
- Eczema
- Dermatite Atopica
- Puntura di Imenottero (api, vespe ecc..)

Due giorni prima dell'esame assumere:

- 2 compresse di Deltacortene 25 mg. Ore 8,00
- 2 compresse di Deltacortene 25 mg. Ore 20,00
- 1 compressa di Tinset 30 mg. Ore 8,00
- 1 compressa di Tinset 30 mg. Ore 20,00

UN'ORA PRIMA dell'esame assumere:

- 2 compresse di Deltacortene 25 mg.
- 1 compressa di Tinset 30 mg.

NB: In caso di conosciuta allergia al mezzo di contrasto o shock anafilattico è consigliato eseguire l'indagine diagnostica inambiente Ospedaliero.

- Prima di iniziare la terapia cortisonica (DELTACORTENE) consultare il proprio medico curante per escludere controindicazioni.
- In caso di eventuali dubbi richiedere direttamente la consulenza anestesiologica al CRM SANT'ANTONIO .



Mod. Preparazione esami TAC e RM con mezzo di contrasto

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PREPARAZIONE ANTIALLERGICA:

II sottoscritto/a
dichiara di aver eseguito la preparazione secondo lo schema soprariportato.
CagliariFirma